

# NATURA na Rabu



Mužjaka bjelonokte vjetruše prepoznaće se vrlo lako: s gornje strane krila ima plava "zrcala", a leđa mu nisu istočkana.

Ženka bjelonokte vjetruše u letu razlikuje se od (obične) vjetruše prema krilnoj formuli. Primarno je letno pero (P10) vrlo dugačko.

Bjelonokte vjetruše hrane se uglavnom krupnim kukcima te rijedce glodarcima i gmazovima (na slici nosi zmiju). Zbog takvog načina prehrane, ove ptice zimaju u Africi.

Bjelonokte vjetruše izrazito su društvene ptice, stoga se gnijezde u kolonijama i okupljaju u jata pri lovu te za vrijeme seobe.

Otok Rab zadržao je vrijedne kulturne krajolike stvorene ljudskom djelatnošću kao što su, primjerice, maslinici, vinogradi, voćnjaci, polja i pašnjaci. Oni obogaćuju krajobrazu i biološku raznolikost Hrvatske, ali u zaštiti prirode mogu biti zanemareni jer nisu u potpunosti prirodna staništa kao šume, močvare ili planine. Intenziviranjem poljoprivrede i stočarstva drastično je izmijenjen izgled kulturnih krajolika u Europi, stoga su fauna i flora vezane uz takva staništa izrazito ugrožene.

Kamenjarski pašnjaci na Sredozemlju zadržali su ekstenzivni način gospodarenja, tako da na otocima Kvarnera nalazimo zadnje prostrane pašnjake za ovce i drugu stoku. Kako se ti pašnjaci ne tretiraju gnojivima i pesticidima, oni pružaju utočište ugroženoj flori i fauni koja je nekoć bila šire rasprostranjena.

Projekt "Natura na Rabu" realizirala je Udruga BIOM, a financiran je od Ministarstva kulture RH.

TEKST Udruga BIOM, FOTOGRAFIJE Kristijan Mandić, DIZAJN Tihana Pećirko



1 Kamenjarski pašnjaci su na prv pogled nalik pustinjama, ali na njima obitava veliki broj vrsta specijalizirane faune i flore.  
2 Odrasti oblik mravljeg lava (*Palpalurus sp.*), kao ličinka se hrani pretežno mravima koje loviti u posebnim jekastim jamama.

3 Sivi čuk (*Athene noctua*), ova mala sova trazi otvoren teren za gnijezdenje gde se uglavnom hrani kukcima.  
4 Talijanska šaška (*Caloptamus italicus*) jedna je od najčešćih vrsta skakavaca na pašnjacima i predstavlja drugim životinjama značajnu prehranu.

5 Šmrka ili smrč (*Juniperus oxycedrus*) pojavljuje se kao grm na pašnjacima. Kako ga stoka ne brsti može zarasti pašnjake.

6 Primorska trepteljka (*Anthus campestris*) i ševa krunica (*Lullula arborea*) dvije su ugrožene ptice koje su obojene poput tla na kojem se gnijezde. Zbog nestanka staništa, danas su sve rijde u Europi. (Slika 6: Steven Round, Slika 7: Marko Mateško)

Glavna fotografija: Bjelonokta vjetruša (*Falco naumanni*)

